

# REHISOL PLUS săruri de rehidratare orală cu *Saccharomyces boulardii*

## Supliment alimentar cu îndulcitor

### Ingrediente plic A (*Saccharomyces boulardii*):

*Saccharomyces boulardii* CNMC I-3799 – 5mld ufc\*/46,05%; *agenți de încărcare*: maltodextrină, amidon din porumb; *îndulcitor*: fructoză; *agent antiaglomerant*: dioxid de siliciu.

\*ufc = unități formatoare de colonii

### Ingrediente plic B (săruri de rehidratare orală):

Compoziție	mmol/l
Glucoză	90
Na <sup>+</sup>	60
K <sup>+</sup>	20
Cl <sup>-</sup>	50
Citrat	10
Osmolaritate	230

Dextroză anhidră – 65,02%, citrat de sodiu dihidrat – 11,76%, clorură de sodiu – 7,01%; *potențiatori de aromă*: portocală, lime; clorură de potasiu – 6,02%; *agent antiaglomerant*: dioxid de siliciu; *îndulcitor*: sucraloză.

Doza zilnică maximă/3 plicuri furnizează 1330 mg cloruri/166% VNR\* și 586 mg potasiu/29% VNR\*.

\*Valoare Nutrițională de Referință cf. Regulament 1169/2011

### Acțiune:

**REHISOL PLUS** este un supliment alimentar pe bază de săruri minerale și *Saccharomyces boulardii*. Sărurile minerale sunt utile pentru furnizarea suplimentară a acestor nutrienți în dieta zilnică.

**REHISOL PLUS - săruri de rehidratare orală cu *Saccharomyces Boulardii*** compensează pierderea de minerale și lichide, ajută la atenuarea stării de deshidratare și la echilibrarea hidroelectrolitică. *Saccharomyces boulardii* favorizează restabilirea florei intestinale.

### Mod de utilizare:

Se recomandă administrarea plicului A (*Saccharomyces boulardii*) împreună cu plicul B (săruri de rehidratare orală), dizolvate în 250 ml de apă plată sau ceai neîndulcit.

Sugari și copii: Plic B: 1 - 2 plicuri pe zi (în funcție de greutate și gradul de deshidratare al copilului).

Plic A: 1 - 2 plicuri pe zi (în funcție de vârstă sau conform recomandării consultantului de specialitate).

Adulți: Plic B: 2 - 3 plicuri pe zi (în funcție de greutate și gradul de deshidratare).

Plic A: 2 - 3 plicuri pe zi (conform recomandării consultantului de specialitate).

Cantitatea utilizată în 24 de ore se stabilește în funcție de vârstă, greutate și severitatea pierderilor de apă și electroliți.

La copii, se recomandă consultarea medicului pentru ajustarea dozei.

Soluția se administrează pe o perioadă de cel puțin 4 ore, cu lingurița sau treptat, din biberon.

În situația în care rehidratarea nu reușește să compenseze pierderile de minerale și lichide, se recomandă prezentarea la spital.

### Atenționări:

A nu se depăși porția recomandată pentru consumul zilnic. A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor mici. Conține îndulcitor. Contraindicat persoanelor intolerante la fructoză. Consumul excesiv poate avea efect laxativ. Produsul este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. Nu se recomandă utilizarea de către persoanele cu alergii la oricare dintre ingredientele produsului. Nu conține gluten. Nu conține lactoză. Nu conține proteine din lapte de vacă. A se păstra la temperaturi sub 20°C, în ambalajul original, la loc ferit de umiditate și de surse directe de căldură. A se consuma, de preferință, înainte de sfârșitul datei înscrise pe ambalaj (EXP).

### Mod de prezentare: Cutie cu 6+6 plicuri

Plic A: 1,9 g

Plic B: 6,25 g

Certificat de notificare SNPMAPS

Seria: AA12769/2019

**Cantitate netă: 48,9 g**



**Producător:**

Erbozeta S.p.A.

Strada delle Seriole, 41/43

47894 Chiesanuova, Republica San Marino

www.erbozeta.com | info@erbozeta.com



**Deținător notificare & Distribuitor:**

Dr. Phyto SRL

Str. Nađeș nr. 40D, Sector 1, București,  
România

Tel: +4031 425 5546

www.drphyto.ro | info@drphyto.ro